









MHT Fordamper

Varenr. 0314

Kort behandling	På 1 magasin	På 2 magasiner
Dosering	4,6 ml Myresyre per tavle	3,2 ml Myresyre per tavle
Eksempel (anbef. mængde)	11 tavler x 4,6 ml = 50 ml	22 tavler x 3,2 ml = 70 ml
Skala-Indstilling Behandl. fra top (lukket centrum)	 2	 2½
Skala-Indstilling Behandl. fra bund (lukket centrum)	 2½	 3
Behandlingsperiode	juli/august - efter honninghøsten	
Behandlingstid	5 - 7 Dage	5 - 7 Dage

Lang behandling	På 1 magasin	På 2 magasiner
Dosering	8 ml Myresyre per tavle	6 ml Myresyre per tavle
Eksempel (anbef. mængde)	11 tavler x 8 ml = 88 ml (90-100 ml)	22 tavler x 6 ml = 132 ml (130-140 ml)
Skala-Indstilling Behandl. fra top	 2½	 3-4*
Skala-Indstilling Behandl. fra bund	 3½	 4*
Behandlingsperiode	september - efter vinterfodring	
Behandlingstid	10 - 15 dage	10 - 15 dage

Efterbehandling	På 1 magasin	På 2 magasiner
Dosering	5,4 ml Myresyre per tavle	3,6 ml Myresyre per tavle
Eksempel (anbef. mængde)	11 tavler x 5,4 ml = 60 ml	22 tavler x 3,6 ml = 80 ml
Skala-Indstilling Behandl. fra top (lukket centrum)	 3	 4
Skala-Indstilling Behandl. fra bund (åben centrum)	 3*	 4*
Behandlingsperiode	sept.-okt. - 2 uger eftersidstebehandling	
Behandlingstid	7 Dage	7 Dage

*Centrum skal være åben, når temperaturen i stedet kommer under 15 °C. Dette sker, når bierne om efteråret trækker sig tilbage til en løs klase.

Fordamperen er udviklet til 85% myresyre. En 60% løsning kan anvendes, dog skal man der regne med den dobbelte mængde for at opnå optimal fordampning.

Kort behandling

Umiddelbart efter slyngning juli/august

Varighed: 5 til 7 dage

I stærkt angrebne familier forlænges

behandlingsperioden fra 10 til 15 dage med

samme skala indstilling.

Doseringsmængden skal da forøges til den

samme som ved den lange behandling.

Lang behandling

Under alle omstændigheder som en 2. behandling

efter vinterfodringen. Varighed 10 til 15 dage.

Efterbehandling

Ved fornyet reinfektion, eller ved

utilstrækkelig behandling:

Bliver der dagligt fundet 1 eller flere mider på

indskudsbakken, skal der efterbehandles.

Det skal ske senest 10 dage efter endt behandling

(omkring slutningen af september).

Kontrol af Behandlingen

10 dage efter behandlingen skal

indskudsbakken rengøres og den følgende

uge skal der kontrolleres for eventuel mide nedfald.

Finder man 1 eller flere mider per dag

er en efterbehandling nødvendig.

Afd. Havndal
v/Henrik Hansen
Østerbro 1
8970 Havndal
Tlf: 8647 0452
www.obcbiavl.dk
obcbiavl@mail.dk



Afd. Hørning
Daglig leder Karsten Sejer Jakobsen
Dørup Gade 6
8362 Hørning
Tlf: 2927 5914
www.damgaardensbiavl.dk
damgaardensbiavl@gmail.com